

## การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในกาแฟ

ระยะเวลาเจริญเติบโต	พื้ต้นหลังเก็บเกี่ยว	ขยายลูกเล็ก	สะสมน้ำหนัก	ก่อนเก็บเกี่ยว	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน				ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย				
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-9-20 อัตรา 25 กิโลกรัม ทุกๆ 20 วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-30	อัตรา 25 กิโลกรัม ทุกๆ 1 เดือน		ต่อไร่

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก