

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในตะไคร้หอม

ระยะเวลาเจริญเติบโต	1 เดือน	2 เดือน	3 เดือน	4 เดือน	5 เดือน	6 เดือน (เก็บเกี่ยว)	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 15 วัน	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน					ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย						
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม			ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม		ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยว ทุกๆ 3 เดือน	ต่อไร่

เก็บเกี่ยวครั้งแรก หลังปลูก 6 เดือน และสามารถเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปทุกๆ 3 เดือน โดยตัดใบเหนือดินประมาณ 30 ซม.

การปลูกตะไคร้หอมหนึ่งครั้ง มีอายุการให้ผลผลิต 2-3 ปี

โปรแกรมจัดการ/ระยะเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก