

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในผักกาด

ระยะเวลาเจริญเติบโต	หลังปลูก 7 วัน	หลังปลูก 14 วัน	หลังปลูก 21 วัน	หลังปลูก 28 วัน	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง				ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย				
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 10 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 20 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-9-20 อัตรา 50 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 25 กิโลกรัม		ต่อไร่

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก