

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในพริกไทย

ระยะเวลาเจริญเติบโต	แตกใบอ่อน	ติดดอก	เริ่มติดลูก	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน			ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย			
การใส่ปุ๋ยทางใบ			ฉีดพ่นธาตุอาหารรองและเสริมทางใบ Ca Zn B ตามอัตราการใช้ข้างฉลาก	
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยสูตร 24-7-7 อัตรา 50 กิโลกรัม ทุกๆ 1 เดือน	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-9-20 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B ในอัตราส่วน 2:1 อัตรา 25 กิโลกรัม ทุกๆ 15 วัน		ต่อไร่

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก