

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในพืชตระกูลส้ม (ส้ม ส้มโอ มะนาว มะกรูด)

ระยะเวลาเจริญเติบโต	แตกยอดอ่อน	ออกดอก	ติดผล	ขยายขนาดผล	ผลแก่	เก็บเกี่ยว / ฟิ้นฟูต้น หลังเก็บเกี่ยว	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 15 วัน	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน					ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้งหรือจนกว่าอาการจะหาย						
การใส่ปุ๋ยทางใบ	ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริม Mn Zn ทุกๆ 15 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือตามอัตราแนะนำข้างฉลาก	ฉีดพ่นธาตุอาหารรองและเสริม Ca Mg Zn B ทุกๆ 15 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือตามอัตราแนะนำข้างฉลาก			ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริม Mn Zn ทุกๆ 15 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือตามอัตราแนะนำข้างฉลาก		
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 400 กรัม ทุกๆ 1 เดือน	ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 400 กรัม ร่วมกับปุ๋ย 14-14-21 อัตรา 200 กรัม ทุกๆ 1 เดือน			ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 400 กรัม ทุกๆ 1 เดือน		ต่อต้น

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก