

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในมะเขือพวง

ระยะการเจริญเติบโต	0 - 30 วัน (ระยะเพาะกล้า)	60 วัน (ย้ายปลูก)	90 วัน	120 วัน (เก็บเกี่ยว)	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 15 วัน	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน			ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย				
การใส่ปุ๋ยทางดิน		ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัม ก่อนย้ายปลูก	ใส่สูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัม หลังย้ายปลูก 30 วัน		ต่อไร่

โปรแกรมจัดการ/ระยะเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก