

## การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในมังคุด

ระยะเวลาเจริญเติบโต	พื้นที่ต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลผลิต	แตกใบอ่อนชุดที่ 2 และ 3	สะสม อาหาร	ออกดอก	ติดผลขนาดเล็ก	สร้างเนื้อ	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน				ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 15 วัน		ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย						
การใส่ปุ๋ยทางใบ		ฉีดพ่นธาตุอาหารรอง และเสริมทางใบ Ca Mg Zn B ตามอัตราการใช้ ข้างฉลาก ทุกๆ 7-10 วัน จนถึง ระยะแตกตาดอก		ฉีดพ่นธาตุอาหารรองและ เสริมทางใบ Ca Zn B ตาม อัตราการใช้ข้างฉลาก ทุกๆ 7-10 วัน จนถึงก่อนเก็บ เกี่ยว			
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 25 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 25 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-9-20 อัตรา 25 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 15 กิโลกรัม	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-9-20 อัตรา 25 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 + B อัตรา 25 กิโลกรัม	ต่อไร่	

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก