

## ลำไยนอกฤดู

เดือน	การจัดการ
เดือนที่ 1  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  กระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่ 1	-ตัดแต่งกิ่ง  -ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ต้นละ 10 กก.  -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น  -ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 2  กระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่ 2	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น  -ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 3  เตรียมพร้อมในการออกดอก	-ตัดแต่งกิ่งที่ไขว้กัน  -ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 + 0-0-60 สัดส่วน 1:1 อัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น  -ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 4  กระตุ้นการสร้างตาดอก	-ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  -ราดสารโพแทสเซียมทางดิน โดยผสมสารกับน้ำในบัวรดน้ำ ตามอัตรา ที่ต้องการใช้ ราดรอบทรงพุ่ม หรือ ใช้สารโรยรอบทรงพุ่ม(การให้น้ำแบบสปริงเกอร์)
เดือนที่ 5  ระยะแทงช่อดอก	-พ่นด้วย Anti-pest(กำจัดแมลง) อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน ก่อนดอกบาน

เดือนที่ 6  ระยะดอกบาน	-เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ
เดือนที่ 7  ระยะติดผลขนาดเล็ก  (ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร)	-ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  -ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น
เดือนที่ 8  ระยะติดผลขนาดกลาง	-ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  -ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตราประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้น
เดือนที่ 9	-ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 10	-ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 11  (ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 30 วัน)	-ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น  -ฉีดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เดือนที่ 12  ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต	ใช้กรรไกรตัดข้อผลให้ลึกเข้าไปประมาณ 1 ฟุต จากปลายข้อ