

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในองุ่น

| ระยะเวลาเจริญเติบโต | แตกตาดอก (เมษายน-พฤษภาคม) | ออกดอก (มิถุนายน-กรกฎาคม) | ติดผล (สิงหาคม) | ผลแก่-เก็บเกี่ยว (กันยายน) | ฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) | ตัดแต่งกิ่ง-ทำค้าง (ธันวาคม-มีนาคม) | อัตราการใช้ |
|---------------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------|
| การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น | ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 15 วัน | ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน | | | ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน | | ต่อน้ำ 20 ลิตร |
| การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค | ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย | | | | | | |

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก

Healthy Plant